

自己注射製剤の処方数の目安一覧

初版:2017/1/26

改訂:2020/1/1

●毎日投与製剤

済生会松山病院 薬剤部

薬剤	1キットあたりの容量	空打ち	1キットで使い切る日数(回数)	開封後の使用期限 ※添付文書上の目安		保存方法		
				使用前	使用後			
インスリン	300単位	2単位	①【1回の注射に必要な単位＝注入単位＋2単位】 として、1日の合計使用単位を計算 ② 1キットで使い切る日数＝300÷①	超速効型	アビドラ ノボラピッド	4週間	2～8℃ (冷所)	室温
					ヒューマログ	4週間(28日間)		
				速効型	ノボリンR	6週間		
				混合型	ヒューマログミックス50	4週間(28日間)		
					ノボラピッド30ミックス	4週間		
					ノボリン30R / イノレット30R	6週間		
				中間型	ノボリンN	6週間		
持効型	インスリングルルギン	4週間(28日間)						
	トレシーバ	8週間						
	レベミル	6週間						
ランタスXR	450単位	3単位	①【1回の注射に必要な単位＝注入単位＋3単位】 として、1日の合計使用単位を計算 ② 1キットで使い切る日数＝450÷①	6週間				
ゾルトファイ	300ドーズ (300単位 / 10.8mg)	2ドーズ	①【1回の注射に必要なドーズ＝注入ドーズ＋2ドーズ】 として、1日の合計使用ドーズを計算 ② 1キットで使い切る日数＝300÷①	30℃以下(室温):3週間 25℃以下 :4週間		2～8℃ (冷所)	室温 (冷所保存も可)	
ビクトーザ	18mg	あり (空打ち専用ダイアル あり=0.12mg)	●初回導入の場合:23日分 ※添付文書通りに漸増(0.3mg/回を7日間→0.6mg/回を7日間→以降0.9mg/回) ●維持量0.9mg/回の場合:17日分 ●維持量1.2mg/回の場合:13日分 ●維持量1.5mg/回の場合:11日分 ●維持量1.8mg/回の場合:9日分	30日間		2～8℃ (冷所)	室温	
バイエッタ 5μg・10μg	300μg	開封後1回目の 注射時のみ 1回分で空打ち	通常1日2回投与(増量の場合は5μg→10μgへ変更) ⇒5μgペンの場合:56回分 10μgペンの場合:28回分 ※バイエッタペン使い方ガイドより	30日間		2～8℃ (冷所)	25℃以下 (冷所保存も可)	
フォルテオ	600μg	開封後1回目の 注射時のみ 1回分で空打ち	28日分 ※添付文書より	28日間		2～8℃ (冷所)		