

自己注射製剤の処方数の目安一覧

初版:2017/1/26

改訂:2022/1/1

●毎日投与製剤

済生会松山病院 薬剤部

薬剤	1キットあたりの容量	空打ち	1キットで使い切る日数(回数)	開封後の使用期限 ※添付文書上の目安		保存方法							
				使用前	使用后	使用前	使用后						
インスリン	300単位	2単位	①【1回の注射に必要な単位＝注入単位＋2単位】 として、1日の合計使用単位を計算 ② 1キットで使い切る日数＝300÷①	超速効型 アピドラ 4週間 ノボラピッド 4週間 フィアスプ 4週間 ヒューマログ・リスプロ 4週間(28日間) 速効型 ノボリンR 6週間 混合型 ヒューマログミックス50 4週間(28日間) ノボラピッド30ミックス 4週間 ノボリン30R / イノレット30R 6週間 ライゾデク配合注 4週間 中間型 ノボリンN 6週間 持効型 インスリングルルギン 4週間(28日間) トレシーバ 8週間 レベミル 6週間	2～8℃ (冷所)	室温							
							ランタスXR	450単位	3単位	①【1回の注射に必要な単位＝注入単位＋3単位】 として、1日の合計使用単位を計算 ② 1キットで使い切る日数＝450÷①	6週間		
							ゾルトファイ	300ドーズ (300単位 / 10.8mg)	2ドーズ	①【1回の注射に必要なドーズ＝注入ドーズ＋2ドーズ】 として、1日の合計使用ドーズを計算 ② 1キットで使い切る日数＝300÷①	30℃以下(室温): 3週間 25℃以下 : 4週間	2～8℃ (冷所)	室温 (冷所保存も可)
							ソリクア	300ドーズ (300単位 / 300μg)	2ドーズ	①【1回の注射に必要なドーズ＝注入ドーズ＋2ドーズ】 として、1日の合計使用ドーズを計算 ② 1キットで使い切る日数＝300÷①	31日間	2～8℃ (冷所)	室温
							ビクトーザ	18mg	あり (空打ち専用ダイアル あり=0.12mg)	●初回導入の場合: 23日分 ※添付文書通りに漸増(0.3mg/回を7日間→0.6mg/回を7日間→以降0.9mg/回) ●維持量0.9mg/回の場合: 17日分 ●維持量1.2mg/回の場合: 13日分 ●維持量1.5mg/回の場合: 11日分 ●維持量1.8mg/回の場合: 9日分	30日間	2～8℃ (冷所)	室温
							バイエッタ 5μg・10μg	300μg	開封後1回目の 注射時のみ 1回分で空打ち	通常1日2回投与(増量の場合は5μg→10μgへ変更) ⇒5μgペンの場合: 56回分 10μgペンの場合: 28回分 ※バイエッタペン使い方ガイドより	30日間	2～8℃ (冷所)	25℃以下 (冷所保存も可)
							テリパラチド	600μg	開封後1回目の 注射時のみ 1回分で空打ち	28日分 ※添付文書より	28日間	2～8℃ (冷所)	